

Perché lo screening per la prevenzione del cancro intestinale è efficace



Lo screening per la prevenzione del cancro intestinale salva vite perché rappresenta il modo migliore di diagnosticare precocemente un tumore dell'intestino. Può anche individuare il tumore prima della comparsa di sintomi.

La diagnosi precoce aumenta le opzioni terapeutiche e le probabilità di sopravvivenza. Uno screening periodico può ridurre i decessi da tumore dell'intestino del **15-25%** e prevenire tra **300 e 500** morti ogni anno.

Lo screening è gratuito, semplice e lo puoi eseguire a casa. Pertanto, quando ricevi il kit, è importante che **esegui lo screening e ci restituisca il kit.**

 **Chiama il numero 1800 118 868**
australia.gov.au/bowelscreening

Se ti serve assistenza per comunicare nella tua lingua, chiama il Servizio traduzioni e interpreti (TIS) al numero 131 450.

Un dono per la vita



Australian Government

**NATIONAL
BOWELCANCER**
SCREENING PROGRAM

Screening per la prevenzione del cancro intestinale. Un dono per la vita.

Il cancro intestinale



Il cancro intestinale è al secondo posto della triste classifica delle cause più comuni di decessi per tumore in Australia. Circa **80** persone in Australia muoiono ogni settimana a causa di questa malattia.

Il cancro intestinale si manifesta nella parete o rivestimento del colon. Inizia a svilupparsi quando le cellule crescono troppo velocemente, formando una massa definita polipo o adenoma. La maggior parte di tali formazioni è benigna (non cancerosa), ma nell'arco di diversi anni, alcuni polipi o adenomi possono diventare cancerosi. Se non viene trattato, il cancro può propagarsi ad altre parti dell'organismo.

Se diagnosticati precocemente, fino al **90%** dei tumori dell'intestino possono essere trattati con successo.



Rischi e sintomi



Il rischio di cancro intestinale aumenta con l'età e se hai compiuto i 50 anni il rischio è di gran lunga superiore.

Altri fattori di rischio di cancro intestinale comprendono precedenti in famiglia, fumo di sigaretta, consumo eccessivo di bevande alcoliche, carenza di attività fisica e una dieta insalubre.

La presenza di uno o più dei sintomi elencati qui sotto non significa che hai un tumore dell'intestino. È importante che tu parli con il tuo medico di famiglia.

I sintomi tipici potrebbero includere:

- Cambiamento delle normali abitudini di evacuazione, ad esempio diarrea o stitichezza
- Cambiamento dell'aspetto delle feci
- Perdita di peso senza un apparente motivo
- Debolezza o spossatezza
- Sangue nelle feci o sulla carta igienica

The National Bowel Cancer Screening Program



Il National Bowel Cancer Screening Program (Programma nazionale di prevenzione del cancro intestinale), varato per la prima volta nel 2006, salva vite tutti i giorni.

Il programma offre lo screening gratuito per l'individuazione di un eventuale tumore dell'intestino agli australiani in possesso dei necessari requisiti. Questi ultimi ricevono per posta un kit gratuito per lo screening quando compiono i 50 anni. A partire dal 2015, il programma verrà allargato ed entro il 2020 a tutti gli australiani di età compresa tra **50 e 74** anni verrà offerto uno screening gratuito ogni due anni.

L'allargamento del programma verrà attuato in varie fasi:

- Le persone di 70 e 74 anni d'età verranno aggiunte nel 2015-16
- Le persone di 72 e 64 anni d'età verranno aggiunte nel 2016-17
- Le persone di 68, 58 e 54 anni d'età verranno aggiunte nel 2017-18
- Le persone di 66 e 62 anni d'età verranno aggiunte nel 2018-19
- Le persone di 56 e 52 anni d'età verranno aggiunte nel 2019-20

Ne consegue che circa **4 milioni** di australiani verranno invitati a sottoporsi allo screening ogni anno