

IL TUMORE DEL COLLO UTERINO SI PUÒ PREVENIRE CON SCREENING CERVICALI A SCADENZA REGOLARE.



PARLA AL TUO OPERATORE SANITARIO OGGI STESSO DELLO SCREENING CERVICALE.

### Dove posso ottenere maggiori informazioni?

Se desideri chiarimenti in merito al nuovo screening cervicale, fissa un appuntamento con il tuo operatore sanitario.

Per saperne di più sullo screening cervicale, visita il sito [cancerscreening.gov.au/cervical](https://cancerscreening.gov.au/cervical) o chiama il numero **13 15 56**.

Il Programma nazionale di screening cervicale è un programma congiunto del governo australiano e delle amministrazioni degli stati e territori australiani.

Se l'inglese non è la tua prima lingua e ti serve aiuto, telefona al Servizio traduzioni e interpreti al numero **13 14 50** al costo di una chiamata locale.

**A qualsiasi età – se presenti sintomi quali emorragie, dolori o perdite vaginali anomale, dovresti rivolgerti subito al tuo operatore sanitario.**

## NATIONAL CERVICAL SCREENING PROGRAM

A joint Australian, State and Territory Government Program



IL PAP-TEST È CAMBIATO  
**PIÙ ACCURATO. MENO FREQUENTE.**



Australian Government


## Screening cervicale

Lo screening della cervice uterina è cambiato in Australia. Il Pap-test è stato sostituito dal nuovo screening cervicale (Cervical Screening Test) da eseguire ogni cinque anni. Le più recenti risultanze mediche e scientifiche dimostrano che uno screening cervicale ogni cinque anni è altrettanto sicuro e più efficace del Pap-test biennale.

L'esame è un intervento rapido e semplice per controllare la salute del collo uterino. Nel tuo caso, se in passato ti sei fatta il Pap-test, il modo in cui l'esame viene condotto e le sensazioni da te provate ti sembreranno uguali.

L'intervento potrebbe provocarti un leggero disagio, ma non dovresti provare dolore. Se provi dolore, fallo subito presente all'operatore sanitario. Ricorda, puoi sempre richiedere che l'esame venga condotto da un medico femmina.

La cervice uterina è l'apertura dell'utero (detta collo dell'utero), e si trova nella parte superiore della vagina (vedi il grafico che segue).



## Perché lo screening cervicale è più accurato?

Anche se non noterai differenze, il modo in cui il campione viene conservato e analizzato è diverso. Le più recenti risultanze mediche e scientifiche dimostrano che il nuovo screening cervicale è più efficace nel rilevare più precocemente il papilloma virus umano (HPV) che provoca anomalie alla cervice uterina.

Il tumore del collo uterino è raro e di solito ci vogliono 10 anni perché anomalie causate da questo virus si trasformino in tumore del collo uterino.

Si prevede che i cambiamenti al Programma nazionale di screening cervicale (National Cervical Screening Program) a seguito dell'introduzione del nuovo esame proteggeranno dal tumore della cervice uterina fino al 30% in più di donne.

Una maggiore comprensione dei tumori del collo uterino e i cambiamenti all'esame dovrebbero farti sentire più sicura. Il nuovo screening cervicale è un esame più accurato, efficace e sicuro da farsi ogni cinque anni invece del Pap-test biennale.

Il tuo operatore sanitario riceverà i tuoi risultati dopo circa due settimane dall'esame e potrebbe contattarti per parlare dei risultati.

**Per operatore sanitario s'intende il medico di famiglia (GP), personale infermieristico oppure un medico presso un centro sociosanitario o centro di salute della donna, centro di pianificazione familiare o ambulatorio per la salute sessuale nonché l'Aboriginal Medical Service - tutti questi soggetti possono eseguire lo screening cervicale. Ricorda, puoi sempre richiedere un operatore sanitario di sesso femminile.**

## Devo farmi uno screening cervicale?

Se sei una donna di età compresa tra i 25 e i 74 anni e sei stata sessualmente attiva nel corso della vita, dovresti sottoporerti a screening cervicale ogni cinque anni fino all'età di 74 anni.

Il primo screening cervicale va fatto all'età di 25 anni oppure due anni dopo l'ultimo Pap-test. Se i risultati sono normali, l'esame successivo andrà fatto dopo cinque anni.

---

**Ogni anno, a circa 800 donne in Australia viene diagnosticato un tumore del collo dell'utero, tuttavia la maggior parte di tali tumori si può prevenire con uno screening a scadenza regolare.**

---

